



| Productos | Dosis por aplicación kg-Lt / ha | Dosis por aplicación gr-cc/HL | N° Aplic. | Época Aplicación / dosis (kg-Lt/ha) | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------------------------------|---|---------------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------|--------------|--------------|
| | | | | Aplicación 1 | Aplicación 2 | Aplicación 3 | Aplicación 4 | Aplicación 5 | Aplicación 6 | Aplicación 7 | Aplicación 8 | Aplicación 9 |
| | | | | Primeras hojas visibles | Hojas Extendidas, Botón Floral Visible | Petalos visibles | Flash Crecimiento Radicular | Plena flor | Cuaja, Inicio Fruto Formado | Llenado de frutos | Precosecha | Postcosecha |
| Basfoliar® Mg Premium SL (12% p/v MgO) | 4 a 5 L | 200 a 300 cc | 2 | | 4,0 L | | | | | 4,0 L | | |
| Basfoliar® Ca Premium SL (18% P/V CaO) | 5 - 6 L | 300 a 400cc | 3 | | | | | | | 5,0 L | 5,0 L | 6,0 L |
| Basfoliar® Zn Premium SL (7% p/v Zn) | 0,5 -1,5 L | 35 a 150 cc | 3 | 0,5 L | | 0,5 L | | | | | | 1,5 L |
| Basfoliar® K Premium SL (25% p/v K20) | 6- 8 L | 500-600 | 3 | | | | | | | 8,0 L | 8,0 L | 8,0 L |
| Basfoliar® Boro SL (13,3% p/v B)* | 0,5-0,9 L | 35 a 40 cc | 1 | | | | | 0,5 L | | | | |
| Basfoliar® Top N SL | 5 L | 500 cc | 1 | | 5,0 L | | | | | | | |
| Basfoliar® Kelp SL | 3 a 4 L | 300 cc 400 cc | 4 | | | 4,0 L | | | 4,0 L | 4,0 L | 4,0 L | |
| Basfoliar® Algae SL | 3 a 5 L | 300 a 400 cc | 4 | 3,0 L | 3,0 L | | 3,0 L | 3,0 L | | | | |
| Basfoliar® 10-4-7 SL | 3 a 4 L | 300 a 350 | 1 | 3,0 L | | | | | | | | |
| Basfoliar® Molibdeno SL** | 0,5 L | 50 cc | 1 | | | | | | | | | 0,5 L |
| Vitanica® CuTan SL*** | 1 a 2 L | 200 cc | 2 | 1,5 L | 2 L | | | | | | | |
| Vitanica® RZ (foliar) | 4 L | 300 cc 400 cc | 2 | | | | | | 4 L | 4 L | | |
| Vitanica® RZ (via riego) | 5 a 10 L | 200 a 300 cc | 4 | | | | 10,0 L | | 5,0 L | | 5,0 L | 5,0 L |

* Aplicar a inicio de flor.

** Para aplicaciones de Basfoliar Molibdeno SL se recomienda consultar con Zonal.

*** Aplicar con brote sobre 5 cm



@compoexpertchile



@compoexpertchile



@compoexpertchile